


Prezentace přípravku Apiguard

Kdy přípravek použít?



Min +15°C

Apiguard lze použít v létě, pokud možno hned po sklizni, kdy průměrná denní teplota dosáhne 15°C.

Včely jsou při teplejším počasí více aktivní, a tím napomáhají působení přípravku Apiguard v celém včelstvu. Pokud je zapotřebí včelstvo nakrmit, začněte s léčbou o několik dní dříve, aby mohl přípravek začít působit ještě předtím.

Praktické rady a postřehy

- Ujistěte se, že včely dělnice mají přístup k misce. V některých úlech se musí vytvořit prostor nad miskou, například použitím nástavku, obráceného horního krytu úlu, krmného korýtka nebo prázdného medníku.
- Misky ponechte v úlu, dokud se všečen gel nerozpustí.
- Kontrolujte změny ve včelstvu: někdy je zapotřebí další léčby mimo sezónu.
- Po zahájení léčby může být někdy včelstvo dočasně neklidné, avšak nejedná se o nic vážného.
- Během léčby si lze někdy povšimnout charakteristického zápachu thymolu.
- **POZNÁMKA:** U malého či slabého včelstva a včelích plodů by měly být použity dávky o obsahu 1 x 25g.

Med se nesmí konzumovat po dobu: 0 dní

Apiguard je ochranná známka firmy VITA (Europe) Limited – Velká Británie.

Vyrobeno pro firmu Vita firmou Laleham Healthcare Ltd – Hampshire – Velká Británie.

Složení: thymol 12,5 g. Excipient QSP, 1 miska – 50 g.

Indikace: pro léčbu varroózy způsobené kleštíkem včelím (Varroa destructor) (Anderson & Trueman). Vždy se řiďte informacemi v příbalovém letáku.

Kontraindikace: nejsou známy.

Nežádoucí vedlejší účinky: mírný neklid včelstva po zahájení léčby trvající několik dní.

Apiguard je veterinářský přípravek.

Distribuce a prodej APIGUARDU v České republice:
LÖFFELMANN – MEDOCENTRUM
Včelařský dům Medocentrum
Náchodská 35
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Tel. 222 563 589

www.medocentrum.cz, Info@medocentrum.cz



Miska o obsahu 50g.
Balení obsahuje 10 misek k
ošetření 5 včelstev.

Způsob použití přípravku



1. Otevřete misku s přípravkem.



2. Misku umístěte na plodové rámy.



3. Po dvou týdnech misku vyměňte.



4. Léčba trvá přibližně 4 – 6 týdnů.